

別紙 ウンカ類の防除薬剤

系統	一般名	商品名	使用倍率、 使用量	使用時期 (収穫前日数)	使用 回数	使用 方法	成分含む使用回数		
IGR、カーバ メート	ブプロフェジン・BPMC 粉剤	アブロードバッサ粉剤 DL	3～4kg/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	ブプロフェジン4回以内、BPMC5 回以内		
IGR	ブプロフェジン水和剤	アブロードフロアブル	1000倍、60～ 150リットル/10a	収穫7日前まで			4回以内	散布	ブプロフェジン4回以内(但し、耕 起前の空中散布は2回以内、耕 起後の空中散布及び無人ヘリ散 布は合計1回以内、小包装投入 は1回以内)
		アブロード水和剤	1000～2000倍 300倍、25リット ル/10a						ブプロフェジン4回以内
ネオニコチノ イド	イミダクロプリド粉剤	アドマイヤー粉剤DL	3～4kg/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	イミダクロプリド3回以内(本田で は2回以内)		
	ジノテフラン粉剤	スタークル粉剤DL アルバリン粉剤DL	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内		散布	ジノテフラン4回以内(本田期は3 回以内)	
		スタークル粒剤 アルバリン粒剤	1kg/10a	収穫7日前まで				ジノテフラン4回以内(育苗箱へ の処理及び側条施用は合計1 回以内、本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は合計3回以 内)	
		スタークルメイト1キロ H粒剤 スタークル1キロH粒剤						クロチアニジン4回以内(但し、 育苗箱散布は1回以内、本田で は3回以内)	
	クロチアニジン粉剤DL	ダントツH粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	4回以内		散布	クロチアニジン4回以内(但し、 育苗箱散布は1回以内、本田で は3回以内)	
	クロチアニジン粉剤	ダントツ粉剤DL ダントツ粒剤	3kg/10a					ニテンピラム4回以内	
	ニテンピラム粉剤	ベストガード粉剤DL ベストガード粒剤	3～4kg/10a	3回以内	散布		散布	ジノテフラン4回以内(育苗箱へ の処理及び側条施用は合計1 回以内、本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は合計3回以 内)	
	ジノテフラン水溶剤	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	3000倍、60～ 150リットル/10a					収穫7日前まで	ジノテフラン4回以内(但し、本田 期は3回以内)
	ジノテフラン液剤	スタークル液剤10 スタークルメイト液剤1 0	1000倍、60～ 150リットル/10a					収穫7日前まで	クロチアニジン4回以内(但し、 育苗箱散布は1回以内、本田で は3回以内)
	クロチアニジン水和剤	ダントツフロアブル ダントツ水溶剤	5000倍、60～ 150リットル/10a 4000倍、60～ 150リットル/10a 1000倍、25リット ル/10a					収穫14日前まで	ジノテフラン4回以内(但し、本田 期は3回以内)
カーバメート	BPMC粉剤	バッサ粉剤30DL	3～4kg/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	BPMC5回以内		
	BPMC乳剤	バッサ乳剤	1000～2000倍				BPMC5回以内、MEP4回以内 (本田期は3回以内)		
カーバメート、有機リン	BPMC・MEP粉剤	スミバッサ粉剤50DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	3回以内 (但し、出 穂前は1 回)	散布	BPMC5回以内、MEP2回以内		
	BPMC・MPP粉剤	バイバッサ粉剤DL		収穫21日前まで	2回以内		BPMC5回以内、MEP2回以内		
ピレスロイド	シラフルオフェン粉剤	MR・ジョーカー粉剤DL	2000倍、60～ 150リットル/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	シラフルオフェン2回以内		
	エトフェンブロックス粉剤	トレボン粉剤DL					エトフェンブロックス3回以内		
	シラフルオフェン乳剤	MR・ジョーカーEW	収穫14日前まで	2回以内	シラフルオフェン2回以内				
	エトフェンブロックス乳剤	トレボン乳剤	1000～2000倍	収穫21日前まで	3回以内		エトフェンブロックス3回以内		
有機リン	MPP粉剤	バイジット粉剤2DL	3～4kg/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	MPP2回以内		
	マラソン粉剤	マラソン粉剤3	3kg/10a	収穫7日前まで	5回以内		マラソン5回以内		
	DEP乳剤	ディテレックス乳剤	1000倍	収穫14日前まで	4回以内		DEP4回以内		
有機リン、 ピレスロイド	イソキサチオン・エトフェ ンブロックス粉剤	カルホストレボン粉剤DL	3～4kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	イソキサチオン3回以内、エトフェ ンブロックス3回以内		
カーバメート、有機リン	BPMC・MPP粉剤	バイバッサ粉剤DL					2回以内	BPMC5回以内、MPP2回以内	
ピレスロイド、ネイスト キシ	エトフェンブロックス・カル タップ粉剤	パダントレボン粉剤DL					5回以内	エトフェンブロックス3回以内、カル タップ6回以内	
ネイストキシ ン、カーバ メート	カルタップ・BPMC粉剤	パダンバッサ粉剤DL	4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	カルタップ6回以内、BPMC5回 以内		
ピレスロイド、IGR	クロマフェノジド・シラフル オフェン粉剤	マトリックジョーカー粉 剤DL					クロマフェノジド2回以内、シラフル オフェン2回以内		
-	シラフルオフェン・テブ フェノジド粉剤	ミックジョーカー粉剤 DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	シラフルオフェン2回以内、テブ フェノジド2回以内			
-	ピメトロジン水和剤	チェス水和剤	2000倍、100～ 150リットル/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	ピメトロジン3回以内(本田期は2 回以内)		