

台風に対する農作物等の技術対策

平成 29 年 8 月 2 日
防府とくち農業協同組合営農部

I 水稻

<事前対策>

1

台風が接近したら早めに深水湛水する。特に、ほ場外周部が乾燥しないように注意する。

<事後対策>

台風通過後は、白葉枯病、穂いもち病、紋枯病、トビイロウンカが多発するので、発生状況を確認し防除を徹底する。

1 倒伏したほ場

(1) 排水の実施

暗渠排水の栓及び排水口を解放し、排水溝を設ける等してほ場排水に努め、穂発芽等による品質低下を最小限にとどめる。

2 冠水及び浸水したほ場

一旦落水して根に酸素を与えた後に入水する。入水後はほ場の水はけの状態に応じて間断灌水の間隔を調節して、根の健全化と地耐力をつける。

3 高潮による海水流入後の対策

(1) 速やかに排水を行い、海水がほぼ落水すれば、清水の掛け流し、入水・落水を繰り返す。

(2) 来春の水稻作付け前に土壌分析（EC の測定）し、1.5mS 以上の場合は、田植え前に、湛水、代かきを行い、田面水の濁りが消えてから排水して除塩する。

II 大豆

<事前対策>

1 迅速な排水ができるよう、排水路の点検、清掃を行う。

2 畝立て溝の確実な連結や排水溝への連結を行い、ほ場外排水の円滑化を図る。

<事後対策>

1 台風通過後ほ場に滞水がある場合は、速やかな排水に努める。

2 台風通過後は紫斑病の発生が多いので、防除を徹底する。

III 野菜

【露地野菜】

<事前対策>

- 1 ほふく性のつるを持つもの、葉根菜類では寒冷紗やべたがけ資材で覆い、上から重しをして動揺を防ぐ。
- 2 支柱、ネットを利用している立性のものは、支柱を倒し地面にほふくさせて保護する。
- 3 収穫直前のものは、早めに収穫する。
- 4 秋野菜の定植や間引き作業を延期する。

<事後対策>

- 1 台風通過後は直ちに復元し、傷んだ葉を除き殺菌剤による防除、葉面散布による草勢回復を図る。
- 2 降雨がなく、潮害を伴う場合は人に危険性がなくなれば直ちに散水を行う。
- 3 冠水したほ場では、停滞水による根腐れ等が発生しやすくなるので、排水路の溝上げを行い、すみやかに排水できるようにする。
- 4 排水の遅いほ場では根の活力が低下しているので、草勢、活力回復のため、液肥の葉面散布を行う。
- 5 流入土が沈積したほ場では、中耕・培土作業が可能になり次第早期に行う。
- 6 高潮により海水が侵入したほ場
 - (1) 現作物が継続して栽培できる場合、多量の灌水で除塩する。
 - (2) 改植が必要な場合、土壌分析（ECの測定）し、0.5mS以上では作物の耐塩性を考慮して、湛水・滞水・落水して除塩する。

【施設野菜】

<事前対策>

1 通常対策

- (1) 施設の補強（ハウスバンドの締め直し、被覆資材の補修、側杭の打ち直し等）を行うとともに、補修資材の確保をしておく。
- (2) 換気扇がある施設の場合は、換気扇を利用した室内の減圧、パイプハウスでは棟の支え等、施設の管理に万全を期す。
- (3) 停電に備え、発電機等機具の確保、準備をしておく。

2 施設倒壊の危険性が生じた場合

- (1) ハウス被覆資材を切り裂き、骨材の被害防止に努める。
- (2) 事前に防風施設のネットを除去しておく。また、強度が低いパイプハウスの被覆を除去しておき、施設被害の防止に努める。

<事後対策>

- 1 ビニールハウス等施設の倒壊・破損の状況を確認して、修復可能な被覆資材の破損は速やかに修復する。
- 2 アンカーの打ち直し、ハウスバンドの締め直しと補強、防風施設の修復を行う。

3 電気設備等がぬれた場合、感電に十分注意し、復旧に当たっては水気をふき取り、通風等により十分乾燥させた後、電源を入れる。

4 高潮により海水が侵入したほ場については、露地野菜に準じて対策を取る。

IV 果樹

【全般】

<事前対策>

1 防風ネットの点検と補強を行う。防風施設倒壊のおそれが生じる場合、事前に防風施設のネットを除去しておく。

2 果樹棚は棚の引き下げアンカーの増強や周囲ひかえ線の点検、増し締めを行う。

3 シートマルチ栽培では、マルチ押さえや重し等の増強を行う。補強が困難であれば株元に巻き取り、飛散しないよう押さえをしておく。

4 幼木では倒伏しないよう、強度のある支柱を用いて補強する。また高接ぎ樹では新梢を固定しておく。

5 ほ場排水路の点検、整備を行う。

6 収穫期に近づいているものは、状況により早期収穫を行う。

7 病害の事前予防散布（カンキツかいよう病等）を行う。

【カンキツ】

<事後対策>

1 塩分の除去

降雨がなく、潮害を伴う場合は人に危険性がなくなれば直ちに散水する。6時間以内に水洗すると効果が高く、水量は10aあたり2tを目安とする。

2 摘果

落葉した果樹は樹勢の回復を図るため、落葉の程度に応じて摘果する。

<うんしゅうみかんの摘果目安>

・落葉率60%以上で果実が残った樹：全摘果・落葉率60～30%程度の樹：落葉の激しい枝は全摘果し、着葉している枝は20～50%を摘果する。

・落葉率30%以下の樹：20～30%の追加摘果する。

3 樹体管理

(1) 折れた枝は除去し、傷口を癒合剤等で保護する。また裂けた枝は結束・固定し、癒合剤等で保護する。

(2) 樹体の早期回復を図るため、秋肥は落葉程度に応じて施用する。

①落葉程度別の秋肥施用量

・落葉率70%以上の樹：秋肥の施用は中止する。

・落葉率70～50%の樹：基準量の1/3を施用する。

・落葉率50～30%の樹：基準量の1/2を施用する。

・落葉率30%以下の樹：基準どおりに施用する。

②秋枝が発生した場合の施肥

新梢の緑化促進及び耐寒性の強化のため、全摘果樹では摘果後直ちに、結果樹では収穫直後に、2～3回尿素（500倍液）や複合液肥の葉面散布を行う。

【落葉果樹】

＜事後対策＞

1 塩分の除去

耐塩性はカキ、キウイが弱い。潮風害を受け5時間以上経過すると除塩効果がないことから、人に危険性がなくなれば直ちに散水する。（水量は2～3t/10aが目安）

2 樹体管理

(1) 折れた枝はせん除し、切り口を平滑にして癒合剤等で保護する。また裂けた枝で修復可能なものはボルトや誘引ひも等で固定し、癒合剤等で保護する。

(2) 間伐未実施園で損傷の激しい木は被害樹の間縮伐を考える。その際損傷部はせん除して処置しておき、落葉期を待って剪定する。

(3) 台風通過後は直ちに殺菌剤による防除や液肥の葉面散布により樹勢回復を図る。

(4) 落葉した木は果実肥大の低下や生理障害が発生しやすいため、着葉に応じて摘果する。

(5) 落葉によって根の傷みや秋根の発根が少なく、貯蔵養分も少なくなると予想されるため、被害程度に応じて施肥するのがよい。

①落葉率70%以上の場合

・根痛みと発根が少ないと思われるため、礼肥は中止する。

・元肥量は通常量の80%として2回に分け、残り20%分は初期成育を促す目的で2月の追肥で施用する。

・施肥方法は貯蔵養分の消費を少なくするため、断根をとらぬよう中耕や深耕は実施せず、施肥は表層施用にとどめる。

②落葉率60%以下の場合

・礼肥、元肥施肥量は通常量の量、時期に施用する。通常の土壌管理で良いが根痛みを防ぐため極端な断根は避ける。

(6) 耐寒性が低下するため剪定時期も遅らせる。

3 果実管理

カキなどで落葉した樹は果実肥大が劣り糖度が低下するため、落葉に応じた摘果を行う。ブドウは降雨による裂果、強風による脱粒に注意する。

V 花き

＜事前対策＞

1 収穫可能なものは、できる限り収穫を急ぐ。

2 支柱を打ち増しするとともに、フラワーネット等を高目にして倒伏防止に努

める。

3 ガラス温室等施設周辺の飛散しそうなものは事前に撤去しておく。その他は施設野菜に準ずる。

<事後対策>

1 降雨がなく、潮害を伴う場合は人に危険性がなくなれば直ちに散水し、茎葉に付着した塩分を洗い流す。回復後、薄めの液肥を施用する。

2 倒れたり傾いたりしたものは直ちに起こし土寄せする。はね上がりで葉裏等に泥が付着している場合よく洗い流す。

3 冠水したほ場では、停滞水による根腐れ、生育不良が発生しやすくなるので、滞水や排水路の溝上げを行い、すみやかに排水する。

4 草勢が回復するまでは、殺菌剤の散布や液肥を葉面散布する。

5 施設栽培に対する事後対策は施設野菜に準じて行う。

VI 畜産

【飼養管理・衛生管理】

<事前対策>

1 降雨に備え、畜舎周囲に排水溝を掘る、土嚢を積むなどして、施設内への雨水の侵入を防ぐ。

2 糞尿貯留施設の点検を行い、降雨による流出が心配される場合は補修する。

3 畜舎及び堆肥舎等の点検を行い、屋根や壁の補修及び補強を行う。強風であおられた場合に破損・飛散するなどして危険な箇所や物については、適切に補修、収納などの対策を行う。

4 畜舎などは停電・断水の恐れがあるので、自家発電機の試運転、発電出力と使用する施設機械の要求量の点検・給水タンクの手配などの対策を事前に行う。

5 自家発電設備がない場合は、停電を前提として自家発電機の確保を行う。自家発電機の確保は、必要電力量の積算により適当な発電機を確保する(搾乳設備、冷却施設、水槽揚水ポンプ、電気牧柵、自動給餌機、電気温水器、照明器具、自動哺乳装置等)。

<事後対策>

1 浸水した畜舎では速やかに排水対策を実施するとともに、舎内等の消毒・乾燥を促進する。また、畜舎内の雨水がひき次第、汚染部分を水洗いして消毒剤や石灰散布、石灰塗布を行う。

2 乾草、サイレージ等の飼料は泥や雨水に当たっていないことを確認して給与する。

3 停電で搾乳が不可能な場合、給水制限すると同時に高濃度の飼料給与は控える。通電後、直ちに搾乳する。ただし、前搾りを行い乳房炎の有無を確認し、罹患している場合は治療する。

4 牛の体調を確認して、異常牛はすみやかに獣医師の診断を受ける。

5 堆肥や尿溜に入った雨水が流出する恐れがある場合は、土盛りなど行い環境流出を防ぐ。

【飼料作物】

<事前対策>

1 畑の冠水しやすいところは、近くの明きょや排水溝まで溝切りを行い排水対策に努める。また、ほ場に置いたままのロールベールは、冠水の恐れのないところに移動する。

<事後対策>

1 雨水の浸み込んだロールベール乾草やサイレージ、及び、冠水したスタックやバンカーサイロは品質を確認し、飼料用として適当でない場合は、不足分の確保に努める。

2 滞水したほ場は排水溝を掘るなどして排水を促す。また、既存の排水施設に詰まりがないか点検して、排水路を確保する。

3 新播草地などで冠水により表土が流失して裸地化した部分が大きいほ場は、イネ科牧草による追播を早めに行う。

VII 共通

<事前対策>

1 用水の確保(防除、除塩用)。

2 用排水路の点検整備、排水ポンプ等の機具の確保及び点検。

3 支柱等の資材確保と点検、補強。

4 防除用機材の点検、薬剤等の準備。

5 停電に備え、発電機等機具の確保、準備。

6 機械（特にエンジン部分）がかん水した場合は、排水後においてもエンジンをかける前には、専門家に点検を依頼する