

関係機関・団体長
病害虫防除員
農薬管理指導士

様

山口県病害虫防除所長

トビイロウンカの長期予報（技術資料第4号）について

本年のトビイロウンカの発生型予測について下記のとおり送付しますので防除指導の参考にしてください。

記

1 予報内容

(1) 対象地域 県内全域

(2) 今後の予測

ア 過去の発生データを利用した解析方法による予測結果では、「少発生型」になる確率が高い（発生型については参考資料を参照のこと）。

イ 本年は8月の早い時期から坪枯れが発生する可能性は少ないと予測される。
その後も、坪枯れは少なく局所的な発生にとどまると予測される。

2 防除対策

(1) 本年は発生密度が低く、このまま推移すれば防除の必要性は低い。

ただし、第1世代幼虫最盛期（7月27日頃まで）にはほ場で発生密度を確認のうえ、防除の目安を超えるほ場は直ちに防除を実施する。

(2) 防除適期

7月27日頃まで（第1世代幼虫最盛期）

(3) 防除の目安

100株当たり20頭以上（成幼虫）

(4) 本年は、ヒメトビウンカの発生が多いため、ほ場を確認する際には見誤らないようにする。

3 発生状況

(1) 7月中旬の巡回調査では、発生ほ場率は0%（平年5.2%）、10株当たり虫数は0頭（平年0.12頭）で平年に比べやや少なかった。

(2) 飛来はほとんど認められなかったが、6月21日(少)、7月2日(少)、4日(少)頃に飛来があった可能性がある。

(3) 予察灯での誘殺数（4か所、5月11日～7月15日）は、2頭（平年27.0頭）で平年に比べやや少なかった。

4 今後の長期予報発表予定

8月4日、8月19日頃

< 参考資料 >
発生型の解説

		少発生型	9月発生型	8月後半発生型	初期多発生型
各発生型になる確率					
5月中旬移植		79%	8%	10%	3%
5月下旬移植		67%	10%	23%	0%
6月上旬移植		70%	6%	15%	9%
定義		全体的に発生量が少なく、発生ピークの不明瞭な発生型。	9月に入り、主に第3世代幼虫が増加し、発生ピークとなる発生型。	8月4～6半旬に、主に第2世代成幼虫が増加し、発生ピークとなる発生型。	8月前半に、主に第2世代の幼虫が急増する発生型。
発生の模式図	密度				
	月	7月 8月 9月	7月 8月 9月	7月 8月 9月	7月 8月 9月
発生年の概要		少発生年に多い発生型 局所的に坪枯れが発生する	一部地域で多発生することがある発生型	多発生年に出現が多い発生型	激発生年に多い発生型
坪枯れ	発生時期	9月	9月上旬以降	8月下旬以降	8月中旬以降
	発生程度	極少～少	少	並～多	多
対策 (防除の目安を越えるほ場)		防除の目安を越える一部のほ場のみ防除し、他は防除の必要なし。	8月中下旬に防除を実施する。	7月下旬～8月上旬に防除を実施する。	7月中下旬に防除を徹底する。

注) 予測方法は、過去35年間における県予察ほ場(山口市大内)のウンカ類発生状況、飛来状況及び気象条件から本年の発生型を各移植時期別に判別した。

JPP - NET病害虫発生予測システム

飛来日	7月				8月					
	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25
トビロウカ										
6月21日	- - o o o @ @ @ @ o o o o o o A A A A A A A A A				- - - - - o o o @ @ @ @ o o o o o A A A A A A A A A - - -					
7月2日	A - - - - - o o o @ @ @ @ o o o o o A A A A A A - - - - - o o o @ @ @ @ o o o o o A A									
7月4日	A A A - - - - - o o o @ @ @ @ o o o o o A A A A A A A A - - - - - o o o @ @ @ @ o o o o o									

予測月日 2008年 7月 14日
 凡例 A: 成虫 - : 卵 o: 幼虫 @: 防除適期
 主要な飛来 多飛来 並飛来 少飛来

図 トビロウカの防除適期予測